

Quelques oiseaux observables en été le long de la rivière de Pont L'Abbé

QUELQUES CRITÈRES D'IDENTIFICATION DES OISEAUX :

- Taille : il faut un peu d'habitude ... Prendre pour repère un oiseau connu pour vous.
- Silhouette (longueur des pattes, forme du corps et du bec). Traces au sol.
- Milieu de vie : vasières, estuaire, pleine mer, falaises, eaux douce. Zone calme ou bruyante, fréquentée ou non par les chien.
- Saison : selon les espèces on peut voir les hivernants, les migrateurs, les nicheurs, les sédentaires.
- Comportement : cri, vol, plongeon. Solitaire ou grégaire. Fréquence de l'espèce sur le site.
- Couleurs : c'est souvent le plus difficile à distinguer, de plus elles peuvent changer selon l'âge ou la saison

BONNES PRATIQUES

Pour éviter de déranger les oiseaux il faut éviter de les approcher, de les surprendre ou de les poursuivre, et bien sur ne rien leur donner à manger. Pour préserver leur tranquillité, merci de rester discret.

Taille des oiseaux

Taille des oiseaux



LE GRAND CORMORAN

Bon pêcheur, à la nage. Aime les fleuves La dynamique de population est forte. Confusion : cormoran huppé

LE HÉRON CENDRÉ

Craintif, c'est un des plus grands échassiers. Il pêche en guettant sa proie, principalement des alevins.



LA SPATULE BLANCHE

Niche en Hollande mais quelques jeunes restent dans la rivière toute l'année. Pour se nourrir, leur bec très sensible repère dans le sable ou la vase les petits crustacés et vers.



TRACES DE SPATULE



L'AIGRETTE GARZETTE

Fut scalpée au XIX pour sa huppe mise en déco sur les chapeaux. Confusion : le héron



LE TADORNE DE BELON

Le mâle ne se distingue de la femelle qu'à sa bosse sur le bec. Niche dans un terrier sur les rivages. Sédentaire. Vit tout le temps en couple.

UN SITE POUR ALLER PLUS LOIN :

www.oiseaux.net



LA STERNE

Elle niche sur l'île aux Moutons dans la plus grande colonie française. Elle repart en Afrique à la fin de l'été et revient au printemps. Elle plonge de haut pour pêcher des petits poissons.



LA MOUETTE RIEUSE (JEUNE)

Capuchon noir sur la tête en période nuptiale, puis tache sombre derrière l'oeuil. Il part nicher dans les marais. Confusion : goéland argenté



LE GOÉLAND ARGENTÉ

Présent partout dans la rivière et jusqu'à la côte. A Brest, il niche même sur les toits. C'est un détritivore très opportuniste.



LE GOÉLAND BRUN

Peu commun, il est fréquent dans la rivière. Pattes jaunes, corps brun. Confusion : autres goélands.




LE CORMORAN HUPPÉ

La huppe n'est visible qu'en période nuptiale. Vol au ras de l'eau N'aime pas l'eau douce.



L'HUÎTRIER PIE

Porte fort mal son nom il se nourrit de vers, de coques et de moules. Il niche aux Iles Glénan.



LE TOURNE-PIERRE

Son corps se confond aux roches mais il est trahi par ses pattes oranges. Facile d'approche. Porte bien son nom. Confusion : bécasseau ou gravelot.



Bigoudenspot
EVASION NAUTIQUE / BRETAGNE

Au fil de l'eau, différents milieux entraînent une fréquentation plus ou moins marquée des espèces

PORT FRÉQUENTÉ, BRUYANT
ESTRAN VASEUX

MOROS

ZONE SAUVAGE BIEN PROTÉGÉE
ESTRAN VASEUX

ROSQUERNO

ZONE SAUVAGE BIEN PROTÉGÉE
VASIÈRES AVEC UN BEAU TISSU VÉGÉTAL

VERS L'ILE TUDY

ESTUAIRE FRÉQUENTÉ
MILIEU SABLO-VASEUX, PUIS ROCHEUX

ZONE A

ZONE B

ZONE C

Organismes gestionnaires des sites :

